



પસંદગી છે. પુકૃત વયના લોકોમાં જેમની પરિસ્થિતિ થતી ગંભીર છે, તેને ૫૦૦ મિલીની મત્તિ થ દરેક છ કલાકે ત્રી થી અઠવાડિયા આપવી જોઈ. દરેક દીને જેને હાડપીજથ્થે લગતે અથવા બીજી ગુંચવણો હોય તેને intramuscular streptomycin 1g થેજ, tetracycline ના વધતમ આપવી, આ બંને સાધન સાથે કથ્વાની પદ્ધતિ છે.

- આ બંને સાધનોનો ઉપયોગી મપ છે, જે દુધ અને તેની બીજી બનાવટોને સહીસલામત થીત વાપરી શકાય છે. દુધને ઊકાવવું અસચ્ચ છે, જ્યાંચાએ જીવાણુનાશક વધિ ન થઈ શકે.

- આ બંને સાધનોનો ઉપયોગી મપ છે, જે દુધ અને તેની બીજી બનાવટોને સહીસલામત થીત વાપરી શકાય છે. દુધને ઊકાવવું અસચ્ચ છે, જ્યાંચાએ જીવાણુનાશક વધિ ન થઈ શકે.

- આ બંને સાધનોનો ઉપયોગી મપ છે, જે દુધ અને તેની બીજી બનાવટોને સહીસલામત થીત વાપરી શકાય છે. દુધને ઊકાવવું અસચ્ચ છે, જ્યાંચાએ જીવાણુનાશક વધિ ન થઈ શકે. **B abortus strain 19-BA** નો ઉપયોગી મપ છે.

બ્રુસેલોસિસ અટકાવવા માટે જ્યાં જો તેને પુકૃત મંથી નાબૂદ કરવામાં આવે. દેશી અને વદિશી બ્રુસેલોસિસના કેંદ્ર છે FAO/WHO Brucella Center, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar pradeshમાં સ્થપતિ છે.