મણસમં Brucellaનો રેપ તેવ□ ૨ તવનો થેગથી લાંબ સમ્યથી ચલતે, નીચે જાતનો, મ્થ□ચાદા નહી આંકેલો થેગ છે, જે કેટલાક દવિસો, મ્હીના અથ્વા જવલ□ લે વથ□ ષો સુધી ચલે છે. □ ક તેવ□ ૨ તબ્ક□ કો જે અચનક અથ્વા છુપી થીતેચલુ થ્વી બમિથીથી ચલુ થ્ય છે :

- મ્થ□ચાદાવાળો pyrexia (૪૦ - ૪૧ ડગ્ગિ□ થી સેન□ ટીગ□ ૨ેડ સુધી) ચમ્ડીના સંકોચ્ન અને પથ્સેવો.
- Arthralgia/સંધવિા,(સામન□ચત monoauricular) મેટા સાંધ□ મ્ળીને જેવા કે કેડ, ઘુંટણ, ખંભે અને પગની ઘુંટી.
- હળવુ પીઠનુ દથ□ દ.
- મથનો દુખાવો, અનદિ□ થનો થેગ.
- નાના મ્જબુ્ત splenomegaly and hepatomegaly.
- Leucopenia બેજા સાથેસંબંધ્વાળુ lymphocytosis.

સૌથી આકથ□ ષક આકા૨ નૈદાનકિ ચતિ□ થ્ની આ મંદગીની ઉગ□ થ્ત છે અને નૈદાનકિ ચનિ□ હોની ગેથ્હાજથી છે. આ તેવ□ ૨ તબ્ક□ કો બે થી તી□ થણ અઠવાડીયા પછી □ છો થય છે. જો દથ્દીને tetracyclineનો ઉપચ૨ કથ□ચો હોય તે આ થેગ તેવ□ ૨ અથ્વા ઉથ્લો મથ્વાના ફથીથી લક□ ષણો દેખાય છે. કેટલાક થેડા દથ□ દી□ મં (૨૦% સુધી) ઘણા લાંબ સમ્ય સુધી લક□ ષણો દેખાય છે. જીવંત□ થ્થી અલગ થ્હીને અને લોહીના બેક□ ટથીચા, હાડકાની અંદથ્નો મવો, સ□ તી□ થવ અને biposy ના નુમ્ના□ , તેવ□ ૨ થેગના આ તબ્ક□ કા દથ્□ચાન અને serological ચ્કાસણી કથી તેમુ નદિાન થ્ય છે.